

Administración Parenteral de Medicamentos



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE SANITAT



AGÈNCIA
VALENCIANA
DE SALUT

DEPARTAMENTO DE SALUD
DE LA MARINA BAIXA

SERVICIO DE FARMACIA



SERVICIO DE FARMACIA:

JEFE DE SERVICIO:

Amparo Raga Beser

ADJUNTOS:

M^a Angeles Cía Barrio

Máxima Mateo García

Rosa Fuster Ruiz de Apodaca

BECARIAS:

María Pampliega Mayoral

Gema Ripoll Cano

Tamara Yepes Requena

INTRODUCCIÓN

La presente Guía va dirigida al personal de enfermería del Hospital con el fin de conseguir una administración más segura de los medicamentos en su práctica diaria.

La Guía se ha estructurado como un pequeño manual de consulta rápida que puede llevarse en un bolsillo de la bata. Consta de una lista de medicamentos incluidos en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital que precisan administración parenteral y en cada medicamento se ofrece la información clasificada en tres apartados:

1. Nombre: Se hace constar el nombre genérico, el nombre comercial y las distintas presentaciones existentes en el Hospital.

2. Método de administración: Se incluye información sobre tres formas de administración:

Inyección intramuscular

Inyección IV directa

Perfusión IV intermitente

y se especifica una recomendación: « SI » o « NO ».

3. Método de reconstitución, conservación y estabilidad en soluciones IV.

Con la elaboración de esta Guía se pretende proporcionar una herramienta que ayude al personal de enfermería a resolver los problemas relacionados con la administración de los medicamentos y así mejorar la calidad de la atención al paciente.

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
ACETILCISTEINA (Flumil®) Amp 300 mg/3 ml	SI	NO	Dil en 50-100 ml G5% Adm 15-30 min	Rec: no procede Dil: uso inmediato
ACETILCISTEINA (Flumil antídoto® 20%) Vial 2 g/10 ml	NO	NO	1ª dosis + 200 ml G5% 15 min 2ª dosis + 500 ml G5% 4 h 3ª dosis + 1 L G5% 16 h	Rec: no procede Dil: uso inmediato
ACETILSALICILATO DE LISINA (Inyesprín®) Vial 0,9 g	SI Rec con 5 ml API	NO	Dil en 100- 250 ml SF o G5% Perf máx 2 h	Rec: uso inmediato Dil: uso inmediato
ACICLOVIR Vial 250 mg	NO	NO	Rec con 10 ml API o SF Dil en 100-250 ml SF o G5% (conc ≤ 5 mg/ml) Adm 60 min	Rec: 12 h TA Dil: 12 h TA No refrigerar
AMIKACINA Vial 500 mg/2 ml	SI	NO	Dil cada 500 mg en 100 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: no procede Dil: 24 h TA 60 días nevera
AMIODARONA (Trangorex®) Amp 150 mg/3 ml	NO	NO	Dil en G5% a conc > 0,6 mg/ml D inicial: 20 min- 2 h D m: Perf IV 24 h	Rec: no procede Dil: 24 h TA

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
AMOXI-CLAVULANICO Vial 1 g/200 mg Vial 2 g/200 mg	NO	NO	Dil 1 g en 50 ml SF Dil 2 g en 100 ml SF No utilizar G5% Adm 30 min	Rec: uso inmediato Dil: uso inmediato
AMPICILINA (Gobemicina®) Vial 1 g	SI Rec con 4 ml API	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: uso inmediato Dil: 4 h TA 24 h nevera
ATENOLOL (Tenormín®) Amp 5 mg/10 ml	NO	SI Adm lenta 1mg/min	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 20 min	Rec: no procede Dil: 48 h TA Proteger de la luz
AZATIOPRINA (Imurel®) Vial 50 mg	NO	NO	Rec con 5 ml API Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: 5 días Tª 5-25°C Dil: 24 h TA
AZITROMICINA (Zitromax®) Vial 500 mg	NO	NO	Rec con 4,8 ml API Dil en 250 ml SF o G5% Adm 1 h Dil en 500 ml SF o G5% Adm 3 h	Rec: 24 h nevera Dil: uso inmediato
AZTREONAM (Azactam®) Vial 1 g	SI Rec con 3 ml API	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 20-60 min	Rec: 48 h TA 7 días nevera Dil: 48 h TA 7 días nevera

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
BUTILESCOPOLAMINA (Buscapina®) Amp 20 mg/1 ml	SI	SI Adm lenta 5 min	NO	No procede
BUTILESCOPOLAMINA METAMIZOL (Buscapina Compositum®) Amp 20 mg-2,5 g/5 ml	SI	SI Adm lenta 5 min	NO	No procede
CALCIO, GLUCONATO (Suplecal®) Amp 1 g/10 ml	SI (Sólo Adultos)	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min Dil en 500-1000 ml SF o G5% Perf IV 24 h	Rec: no procede Dil: 24 h TA
CASPOFUNGINA (Cancidas®) Vial 50 mg Vial 70 mg	NO	NO	Rec con 10,5 ml API Dil en 250 ml SF Adm 1 h	Rec: 24 h $T^a \leq 25^{\circ}\text{C}$ Dil: 24 h $T^a \leq 25^{\circ}\text{C}$ 48 h nevera
CEFAZOLINA (Tasep®) Vial 1 g	Rec con 1,5 ml lidocaína 2% + 1,5 ml API	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: 24 h TA 96 h nevera Dil: 24 h TA 96 h nevera
CEFONICID Vial 1 g	Rec con 1 ml lidocaína 2% + 1,5 ml API	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 20-30 min	Rec: 12 h TA 72 h nevera Dil: 12 h TA 72 h nevera

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
CEFOTAXIMA Vial 500 mg, 1 g y 2 g	Dosis máx: 1g Rec con 2 ml lidocaína 2% + 2 ml API	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: 24 h TA 5 días nevera Dil: 24 h TA 5 días nevera
CEFTAZIDIMA (Fortam®) Vial 1 g y 2 g	Dosis máx: 1g Rec con 1,5 ml lidocaína 2% + 1,5 ml API	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: 18 h TA 7 días nevera Dil: 18 h TA 7 días nevera
CEFTRIAXONA Vial 1 g y 2 g	Dosis máx: 1g Rec con 1,5 ml lidocaína 2% + 2 ml API	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm en al menos 30 min	Rec: 6 h TA 24 h nevera Dil: 3 días TA 10 días nevera
CEFUROXIMA Vial 750 mg	Rec con 3 ml API	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm en 15-60 min	Rec: 5 h TA 48 h nevera Dil: 12 h TA 48 h nevera
CICLOSPORINA A (Sandimmun®) Amp 50 mg/1 ml	NO	NO	Dil 1 amp en 50-100 ml SF o G5% Adm 2-6 h	Rec: no procede Dil: 12 h SF TA; 24 h G5% TA Usar frascos vidrio

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
CIPROFLOXACINO Vial 200 mg/100 ml	NO	NO	Adm 30-60 min	No procede
CLARITROMICINA (Klacid®) Vial 500 mg	NO	NO	Rec con 10 ml API Dil en 250 ml SF o G5% Adm 60 min	Rec: 24 h TA; 48 h nevera Dil: 6 h TA; 48 h nevera
CLINDAMICINA Amp 600 mg/4 ml	SI	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% C máx: 12 mg/ml Adm 20-60 min	Rec: no procede Dil: 16 días TA 32 días nevera
CLONAZEPAM (Rivotril®) Amp 1 mg/1 ml + Amp con 1 ml API	SI Mezclar el contenido de las 2 amp	Adm lenta	NO	Rec: uso inmediato Dil: no procede
CLORAZEPATO DIPOTASICO (Tranxilium®) Vial 20 mg	SI Rec con el disolvente específico	Adm lenta	NO	Rec: uso inmediato Dil: no procede
CLOXACILINA Vial 1 g	NO	NO	Dil en 100 ml SF o G5% Adm 60 min	Rec: uso inmediato Dil: uso inmediato
COTRIMOXAZOL Sulfametoxazol/ Trimetoprim (Soltrim®) Vial 800 mg/160 mg	Rec con su disolvente, ya que éste contiene el trimetoprim Adm lenta	NO	Dil en la proporción de 1 vial en 250 ml G5% Adm 60-90 min	Rec: 24 h TA Dil: 6 h TA No refrigerar

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
DEXAMETASONA (Fortecortín®) Amp 4 mg/1 ml Amp 40 mg/5 ml)	SI	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: no procede Dil: 7 días TA
DEXKETOPROFENO (Enantyum®) Amp 50 mg/2 ml	SI	NO	Dil en 30-100 ml SF o G5% Adm 10-30 min	Rec: no procede Dil: 24 h TA y en nevera
DIAZEPAM (Valium®) Amp 10 mg/2 ml	SI	SI Adm lenta (0,5-1 ml/min)	Dil 1 amp en al menos 100 ml SF o G5% Adm 15-30 min	Rec: no procede Dil: 24 h TA
DIGOXINA Amp 0,25 mg/ml	NO	NO	Dil 50 ml SF o G5% Adm 10-20 min	Rec: no procede Dil: uso inmediato
DOBUTAMINA Amp 250 mg/20 ml	NO	NO	Dil en 50-1000 ml G5% o SF Utilizar bomba de infusión	Rec: no procede Dil: <12 h TA 24 h nevera
DOPAMINA Amp 200 mg/5 ml	NO	NO	Dil en 250-500 ml SF o G5% Utilizar bomba de infusión	Rec: no procede Dil: 24 h TA
DOXICICLINA (Vibravenosa®) Amp 100 mg/5 ml	NO	NO	Dil en 250 ml SF o G5% Adm en al menos 1h	Rec: no procede Dil: 12 h TA 72 h nevera

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
ERITROMICINA, LACTOBIONATO (Pantomicina®) Vial 1 g	NO	NO	Rec con 20 ml API Dil en 250-500 ml SF Adm 30-60 min	Rec: 24 h TA; 14 días nevera Dil: 8 h TA; 24 h nevera
ERTAPENEM (Invanz®) Vial 1g	NO	NO	Rec con 10 ml API o SF Dil en 50 ml SF Adm 30 min	Rec: uso inmediato Dil: 6 h TA; 24 h nevera
FENITOINA Amp 100 mg/2 ml	NO	NO	Dil en 50-250 ml SF C final: 1-10 mg/ml Vmáx: 50 mg/min	Rec: no procede Dil: uso inmediato
FITOMENADIONA (Konakió®) Amp 10 mg/1 ml	SI	SI Adm lenta en al menos 30 seg	Dil en 50 ml SF Adm 15 min	Rec: no procede Dil: no hay datos
FLUCONAZOL (Citiges®) Vial 100 mg/50 ml Vial 200 mg/100 ml	NO	NO	Adm 100 mg en 30 min Adm 200 mg en 60 min	Rec: no procede Dil: no procede
FLUMAZENILO Amp 0,5 mg/5 ml	NO	SI Adm 1-3 ml en 15 seg	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 0,1- 0,4 mg/h Dil en 500 ml SF o G5% Adm hasta en 12 h	Rec: no procede Dil: 8 h TA y 24 h nevera

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
FLUNITRAZEPAM (Rohipnol®) Amp 2 mg/1 ml + Amp 1 ml API	SI Rec con el disol- vente específico	SI Adm lenta en 1-2 min	NO	Rec: uso inmediato Dil: no procede
FOSFOMICINA (Fosfocina®) Vial 1 g	Rec con 2 ml lidocaína 2% + 2 ml API	NO	Dil en 50-100 ml G5% o SF Adm 1 h	Rec: uso inmediato Dil: 24 h TA
FUROSEMIDA Amp 20 mg/2 ml Amp 250 mg/25 ml	SI	NO	Dil 20 mg en 50-100 ml SF o G5% Vel máx: 4 mg/min Dil 250 mg en 250 ml SF o G5% Adm 60 min	Rec: no procede Dil: 24 h TA
GENTAMICINA Vial 80 mg/2 ml	SI	NO	Dil en 100-250 ml SF o G5% C máx: 1 mg/ml Adm 30-60 min	Rec: no procede Dil: 24 h TA 30 días nevera
HALOPERIDOL Amp 5 mg/1 ml	SI	NO	Dil en 50-100 ml G5% Adm 30 min Dil en 500 ml G5% Perf IV 24 h	Rec: no procede Dil: 7 días TA en G5%

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
HIDROCORTISONA (Actocortina®) Vial 100 y 500 mg	SI	SI Adm lenta Cada 100 mg en al menos 30 seg	Dil en SF o G5% para obtener una conc <1 mg/ml Vel <25 mg/min	Rec: 24 h nevera Dil: 24 h TA
HIERRO (III), SACAROSA (Venofer®) Amp 100 mg/5 ml	NO	NO	Dil 1 amp en 100 ml SF y 2 amp en 200 ml SF Adm 1 h	Rec: no procede Dil: uso inmediato
ILOPROST (Ilomedín®) Amp 50 mcg/0,5 ml	NO	NO	Dil en 250 ml SF o G5% Adm en 6 h en bomba de infusión	Rec: no procede Dil: uso inmediato
IMIPENEM-CILASTATINA (Tienam®) Vial 500 mg	NO Existe presenta- ción específica	NO	Dosis 500 mg dil en 100 ml SF o G5% y adm 20-30 min Dosis 1 g dil en 250 ml SF o G5% y adm 40-60 min	Dil: 4 h TA; 24 h nevera
LABETALOL (Trandate®) Amp 100 mg/20 ml	NO	SI Adm lenta: 50 mg en al menos 1 min	Dil a conc 1 mg/ml en SF o G5% Adm 2 ml/min	Rec: no procede Dil: 24 h TA
LEVETIRACETAM (Keppra®) Vial 500 mg/5 ml	NO	NO	Dil en 100 ml SF o G5% Adm 15 min	Rec: no procede Dil: 24 h nevera

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
LEVOFLOXACINO Vial 500 mg/100 ml	NO	NO	Adm como mínimo en 60 min	Rec: no procede Dil: no procede
LEVOTIROXINA (Levothroid®) Vial 500 mcg	SI Rec con 5 ml SF	SI Adm directamente el contenido del vial reconstituido	NO	Rec: uso inmediato Dil: no procede
LINEZOLID (Zyvoxid®) Bolsa 600 mg/300 ml	NO	NO	Adm 30-120 min	Rec: no procede Dil: no procede
MAGNESIO, SULFATO Amp 1,5 g/10 ml	NO	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30 min	Rec: no procede Dil: 72 h TA
MEROPENEM (Meronem®) Vial 1 g	NO	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 15-30 min	Dil: 10 h TA y 48 h nevera en SF 3 h TA y 18 h nevera en G5%
METAMIZOL (Nolotil®) Amp 2 g/5 ml	SI	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 20-60 min Dil en 500-1000 ml SF o G5% Perf IV 24 h	Rec: no procede Dil: uso inmediato

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
METILPREDNISOLONA (Urbasón®) Amp 8 mg/2 ml Amp 20 mg/2 ml Amp 40 mg/2 ml (Solu-Moderín®) Vial 125 mg/2 ml Vial 1 g/15,6 ml	SI	Dosis máx: 250 mg En casos urgentes en al menos 1 min, preferib. 5 min	Dil en 50-100 ml SF o G5% C final: 0,5-30 mg/ml Adm 30-60 min	Rec: 48 h TA Dil: 48 h TA
METOCLOPRAMIDA (Primperán®) Amp 10 mg/2 ml	SI	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 15-30 min	Rec: no procede Dil: 48 h TA Proteger de la luz
METRONIDAZOL Vial 500 mg/100 ml	NO	NO	Adm 20-60 min	Rec: no procede Dil: no procede
MIDAZOLAM Amp 15 mg/3 ml Amp 50 mg/10 ml	SI	Adm lenta 1 mg en 30 seg	NO	Rec: no procede Dil: no procede
NIMODIPINO (Nimotop®) Vial 10 mg/50 ml	NO	NO	Inicio 1 mg/h, durante 2 h. Si tolerancia aumentar a 2 mg/h	Adm con bomba de infusión Incompatible con PVC
ONDANSETRON (Yatrox®) Amp 4 mg/2 ml Amp 8 mg/4 ml	NO	SI Adm lenta	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 15 min Dil en 500 ml SF o G5% Perf IV 24 h	Rec: no procede Dil: 7 días TA o en nevera

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
PAMIDRONICO, ACIDO (Aredia®) Vial 30 y 90 mg	NO	NO	Rec con 10 ml API Dil 30 mg en 100 ml SF o G5% Adm 60 min Dil 90 mg en 250 ml SF o G5% Adm 2 h	Rec: 24 h nevera Dil: 24 h nevera
PANTOPRAZOL (Anagastra®) Vial 40 mg	NO	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 15 min	Rec: 12 h TA Dil: 12 h TA
PARACETAMOL Vial 1 g/100 ml	NO	NO	Adm 15 min	Rec: no procede Dil: no procede
PENICILINA G Na⁺ BENCILPENICILINA (Penilevel®) Vial 1 M y 5 M U	SI	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 1-2 h Dosis altas $\geq 10M$ dil en 1 L SF o G5% Perf IV 24 h	Rec: 7 días nevera Dil: 24 h TA
PIPERACILINA/ TAZOBACTAM Vial 4 g/0,5 g	NO	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 20-30 min	Rec: 24 h TA; 48 h nevera Dil: 48 h nevera
PIRACETAM (Nootropil®) Amp 3 g/15 ml	NO	NO	Dil en 100-250 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: no procede Dil: 24 h TA

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
PROMETAZINA (Frinova®) Amp 50 mg/2 ml	SI	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: no procede Dil: 24 h TA
PROPAFENONA (Rytmonorm®) Amp 70 mg/20 ml	NO	SI Adm lenta 3-5 min	Dil en 50-100 ml G5% Adm 1-3 h (0,5-1 mg/min)	Rec: no procede Dil: no hay datos
PROPRANOLOL (Sumial®) Amp 5 mg/5 ml	NO	SI Adm lenta 1ml/min	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 1 mg en 10-15 min	Rec: no procede Dil: 24 h TA
RANITIDINA (Zantac®) Amp 50 mg/5 ml	SI	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm en 30-60 min Dil en 500 ml SF o G5% Perf IV 24 h	Rec: no procede Dil: 48 h TA; 14 días nevera
RIFAMPICINA (Rifaldín®) Vial 600 mg	NO	NO	Rec con 10 ml de dte. Dil 600 mg en, al menos, 500 ml SF o G5% Adm 3 h	Rec: 6 h TA; 12 h nevera Dil: uso inmediato

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
SALBUTAMOL (Ventolín®) Amp 0,5 mg/1 ml	SI	NO	Dil en 100-500 ml SF o G5% Adm 3-20 mcg/min	Rec: no procede Dil: uso inmediato
SOMATOSTATINA Amp 3 mg	NO	Adm lenta no menos de 3 min	Dil en 500 ml SF Perf IV 12 h	Rec: 24 h nevera Dil: 24 h nevera
TEICOPLANINA (Targocid®) Vial 400 mg	SI Rec con 3 ml API	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30 min	Rec: 48 TA; 21 días nevera Dil: 24 h nevera
TEOFILINA (Eufilina®) Amp 200 mg/10 ml	NO	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 20-30 min Dil en 500 ml SF o G5% Perf IV 24 h	Rec: no procede Dil: uso inmediato
TIAPRIDA (Tiaprizal®) Amp 100 mg/2 ml	SI	SI	NO	No se dispone de datos
TOBRAMICINA Vial 100 mg/2 ml	SI	NO	Dil en 100-250 ml SF o G5% C máx: 1mg/ml Adm 30-60 min	Rec: no procede Dil: 24 h TA 96 h nevera

MEDICAMENTO	IM	IV DIRECTA	PERFUSION IV	ESTABILIDAD
TRAMADOL (Adolonta®) Amp 100 mg/2 ml	SI	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min Dil en 500 ml SF o G5% Perf IV 24 h	Rec: no procede Dil: uso inmediato
TRANEXAMICO, ACIDO (Amchafibrín®) Amp 500 mg/5 ml	SI	NO	Dil en 50-100 ml SF o G5% Adm 30-60 min	Rec: no procede Dil: uso inmediato
VALPROICO, ACIDO Vial 400 mg	NO	SI Rec con 4 ml API Adm lenta en 3 min	Dil en 500 ml SF o G5% Perf IV 24 h	Rec: uso inmediato Dil: 24 h nevera
VANCOMICINA Vial 500 mg	NO	NO	Rec 500 mg con 10 ml API y diluir cada 500 mg en al menos 100 ml SF o G5% Adm 60 min	Rec: 14 días nevera Dil: 14 días nevera
VORICONAZOL (Vfend®) Vial 200 mg	NO	NO	Rec con 19 ml API Dil en 100-250 ml SF o G5% C final: 0,5-5 mg/ml Perf IV 1-2 h (V máx 3 mg/Kg/h)	Rec: 24 h nevera Dil: uso inmediato
ZOLEDRONICO, ACIDO (Zometa®) Vial 4 mg/5 ml	NO	NO	Dil en 100 ml SF Adm 15 min	Rec: no procede Dil: 24 h nevera


INDICE

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	Página
ACETILCISTEINA	Flumil	5
ACETILCISTEINA	Flumil antídoto 20%	5
ACETILSALICILATO DE LISINA	Inyesprín	5
ACICLOVIR		5
AMIKACINA		5
AMIODARONA	Trangorex	5
AMOXI-CLAVULANICO		6
AMPICILINA	Gobemicina	6
ATENOLOL	Tenormín	6
AZATIOPRINA	Imurel	6
AZITROMICINA	Zitromax	6
AZTREONAM	Azactam	6
BUTILESCOPOLAMINA	Buscapina	7
BUTILESCOPOLAMINA / METAMIZOL	Buscapina Compositum	7
CALCIO, GLUCONATO	Suplecal	7
CASPOFUNGINA	Cancidas	7
CEFAZOLINA	Tasep	7
CEFONICID		7
CEFOTAXIMA		8
CEFTAZIDIMA	Fortam	8
CEFTRIAXONA		8
CEFUROXIMA		8

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	Página
CICLOSPORINA A	Sandimmun	8
CIPROFLOXACINO		9
CLARITROMICINA	Klacid	9
CLINDAMICINA		9
CLONAZEPAM	Rivotril	9
CLORAZEPATO DIPOTASICO	Tranxilium	9
CLOXACILINA		9
COTRIMOXAZOL Sulfametoxazol/Trimetoprim	Soltrim	9
DEXAMETASONA	Fortecortín	10
DEXKETOPROFENO	Enantyum	10
DIAZEPAM	Valium	10
DIGOXINA		10
DOBUTAMINA		10
DOPAMINA		10
DOXICICLINA	Vibravenosa	10
ERITROMICINA, LACTOBIONATO	Pantomicina	11
ERTAPENEM	Invanz	11
FENITOINA		11
FITOMENADIONA	Konakión	11
FLUCONAZOL	Citiges	11
FLUMAZENILO		11
FLUNITRAZEPAM	Rohipnol	12
FOSFOMICINA	Fosfocina	12

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	Página
FUROSEMIDA		12
GENTAMICINA		12
HALOPERIDOL		12
HIDROCORTISONA	Actocortina	13
HIERRO (III), SACAROSA	Venofer	13
ILOPROST	Ilomedín	13
IMIPENEM-CILASTATINA	Tienam	13
LABETALOL	Trandate	13
LEVETIRACETAM	Keppra	13
LEVOFLOXACINO		14
LEVOTIROXINA	Levothroid	14
LINEZOLID	Zyvoxid	14
MAGNESIO, SULFATO		14
MEROPENEM	Meronem	14
METAMIZOL	Nolotil	14
METILPREDNISOLONA	Urbasón, Solu-Moderín	15
METOCLOPRAMIDA	Primperán	15
METRONIDAZOL		15
MIDAZOLAM		15
NIMODIPINO	Nimotop	15
ONDANSETRON	Yatrox	15
PAMIDRONICO, ACIDO	Aredia	16
PANTOPRAZOL	Anagasta	16

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	Página
PARACETAMOL		16
PENICILINA G Na ⁺ BENCILPENICILINA	Penilevel	16
PIPERACILINA/TAZOBACTAM		16
PIRACETAM	Nootropil	16
PROMETAZINA	Frinova	17
PROPAFENONA	Rytmonorm	17
PROPRANOLOL	Sumial	17
RANITIDINA	Zantac	17
RIFAMPICINA	Rifaldín	17
SALBUTAMOL	Ventolín	18
SOMATOSTATINA		18
TEICOPLANINA	Targocid	18
TEOFILINA	Eufilina	18
TIAPRIDA	Tiaprizal	18
TOBRAMICINA		18
TRAMADOL	Adolonta	19
TRANEXAMICO, ACIDO	Amchafibrín	19
VALPROICO, ACIDO		19
VANCOMICINA		19
VORICONAZOL	Vfend	19
ZOLEDRONICO, ACIDO	Zometa	19



 GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE SANITAT



**AGÈNCIA
VALENCIANA
DE SALUT**

DEPARTAMENTO DE SALUD
DE LA MARINA BAIXA